

Chirurgie plastique des gencives

Si la gencive se rétracte sur une dent, il est possible de la repositionner au bon endroit par une petite chirurgie esthétique des gencives.

Le cas de Mme DZ

Importante récession gingivale sur cette canine, due à un brossage trop virulent ou tout simplement parce que la gencive est trop fine.



En quoi consiste la correction des gencives?

C'est une microchirurgie très peu invasive qui consiste à épaissir la gencive et à la réadapter au bon endroit pour recouvrir la racine dentaire.



Questions / Réponses

Puis-je manger normalement après l'intervention ?

Oui, mais en faisant doucement pendant quelques jours.

Peut-on soigner ainsi plusieurs dents ?

Oui, il est même possible de faire toutes les dents d'une arcade.

Et c'est sûr que ça marche ?

Les résultats cliniques sont statistiquement excellents. Cependant, le fait de fumer peut diminuer la qualité de la cicatrisation.

Est-ce que ça va faire mal ?

Non. Aujourd'hui, les techniques anesthésiques permettent de rendre les interventions totalement indolores. Après l'intervention, nous vous prescrivons les médicaments appropriés.

Faut-il revenir plusieurs fois ?

Une fois la procédure réalisée, un contrôle de la cicatrisation est effectué à 7 jours, puis à 1 mois. Un contrôle annuel chez votre dentiste traitant permet un suivi sur le long terme.

Qu'est-ce que je risque en ne le faisant pas ?

La racine exposée de la dent n'est pas conçue pour être à l'air libre. Elle va continuer à s'infiltrer dans le temps.

De plus, les racines encore vivantes peuvent être sensibles au sucre, à l'acide, au chaud, au froid et ça peut aller en s'aggravant.

